



# 千人表演急救操场面震撼

核工业卫生学校举办首届校园文化艺术节

■文/图 本报记者 贺正香  
通讯员 廖红伍

本报讯 为进一步丰富校园文化生活，营造积极向上、清新高雅、健康文明的校园文化氛围，展现学生的青春风采和精神风貌，6月16日，核工业卫生学校举办首届校园文化艺术节。

在热烈的掌声中，南华大学附属南华医院党委书记田英宣布艺术节活动正式开始，千余名青年学生挥舞着国旗，齐唱《歌唱祖国》，场面震撼而欢快，令人心潮澎湃。“通过合唱爱国歌曲，让我们更加了解了中华人民共和国诞生、成长和发展的光辉历史，对祖国的未来更加充满了信心和期待。”一名参加合唱的女同学表示。

我国每年婴幼儿因异物窒息死亡的有近3000人，衡阳市近3年来因气道异物阻塞致死的案例就有20余例。在抢救病人时，时间就是生命，每一分每一秒都要充分利用，作为卫生专业的学生，更应深刻了解并熟悉呼吸道异物预防与救治，做到人人会预防、个个懂急救。

据核工业卫生学校校长马嫦英介绍，走过54载办学历程，核工业卫生学校的文化精髓已化茧成蝶，铸就了今天的辉煌。作为全省唯一一所公办中职卫校，学校先后获得省“职业教育先进单位”“德育工作先进单位”“就业指导先进单位”“职业指导工作先进单位”等20余项荣誉称号，已经成为衡阳市办学实力较强、专业特色鲜明的省级示范性中等职业学校和国家重点中等职业学校。54年来，学校共为国家和地方培养护理等医卫学子2万余人，深受社会和用人单位的欢迎，学校的知名度、美誉度已享誉三湘。马嫦英说，学校不仅要注重形成“技能立校、技能立业”的校园舆论氛围，又要以“文明风采”活动为载体，全面落实立德树人的



南华医院党委书记田英（左三）参观学生书画展

千余名学生表演《海姆立克急救操》

根本任务，以“活动育人、实践育人、文化育人”为目的，把竞赛活动与学校的教学活动、德育工作、校园文化建设等结合起来，使“文明风采”“技能竞赛”真正走进学生生活，促进学生全面发展，形成“班班活动、人人参与”的

良好局面。

核工业卫生学校党总支书记廖红伍在接受记者采访时说，举行校园文化艺术节，目的在于让同学们了解核工业精神与医者仁心的职业信仰，并在丰富的文化艺术活动中学会知识、掌握常识、懂得赏识。本

次文化艺术活动将由千人急救操表演、千人大合唱、书画展、手工制作展、趣味体育运动、核医文化大讲堂、院校史金牌讲解员评选、文艺汇演等一系列文化艺术活动组成。

## 这三类野生毒蘑菇最常见，千万不要采食

市疾控中心提醒市民，野生蘑菇是否有毒一般人难以准确鉴别，千万不要“凭经验”去鉴别。民间流传的识别毒蘑菇的方法，如银针验毒、大蒜去毒等方法并不可靠

■本报记者 贺正香  
通讯员 刘晓雁

进入初夏，由于雨水偏多，野生蘑菇长得又多又快，容易发生误食毒蘑菇中毒事件。近日来，我市个别县已发生野生蘑菇中毒事件，并出现死亡病例。

市疾控中心提醒市民，野生蘑菇是否有毒一般人难以准确鉴别，千万不要“凭经验”去鉴别。民间流传的识别毒蘑菇的方

法，如银针验毒、大蒜去毒等方法并不可靠，切勿相信。

野生蘑菇不要采！不要吃！

有食用野生蘑菇习惯的朋友们，不要轻信民间或网传的一些没有科学依据的毒蘑菇鉴别方法，不要采食野生蘑菇或来源不明的蘑菇，也不要购买个人采摘售卖的蘑菇。对于市场上售卖的野生蘑菇，也不能放松警惕，尤其是没吃过或不认识的，不要轻易食用。

好转，实则造成肝脏严重损害；最后发展成为“内脏损害期”，肝脏等脏器功能严重受损，是导致市民中毒死亡的主要类型之一。每年5—7月份是灰花纹鹅膏菌生长最旺盛的季节。

第二类是剧毒亚稀褶红菇。该菌外观上与老百姓采食的“火炭菌”“炭烧菌”极其相似。误食后10多分钟到2个小时就会出现呕吐、腹泻等症状，随之出现肌肉疼痛、酱油色

尿液等症状，最后出现严重的心肌损伤。如就诊不及时，病死率非常高。该类毒菌也是导致市民中毒死亡最多的类型之一。每年7—10月份是亚稀褶红菇生长最旺盛的季节。

第三类是日本红菇。该菌外观上与老百姓喜爱采食的“石灰菌”极其相似，容易误食。通常在食用后2—4个小时出现呕吐、腹泻等胃肠道症状，不会引起患者死亡。每年6—9月份是日本红菇生长最旺盛的季节。



剧毒鹅膏菌



日本红菇



剧毒亚稀褶红菇

### 三种最常见的野生毒蘑菇

根据近年来我市发生的野生蘑菇中毒案例，给大家介绍三种最常见的野生毒蘑菇。

第一类是剧毒鹅膏菌。主要包括灰花纹鹅膏菌与裂皮鹅膏菌。其中灰花纹鹅膏菌外观上与可食用的“鸡丝菌”相似，裂皮鹅膏菌通体白色，老百姓常易误食。误食6—15小时之后就会出现呕吐、腹泻等胃肠道症状，称之为“胃肠炎期”；之后患者胃肠道症状消失到达“假愈期”，此时表面上看似