

打过疫苗后还需要戴口罩吗？

国家卫健委就疫苗接种等热点问题给予回应

国家卫生健康委员会 21 日通报，3 月 20 日 0—24 时，31 个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例 12 例，均为境外输入病例（上海 4 例，甘肃 3 例，天津 2 例，内蒙古 1 例，江西 1 例，广东 1 例）；无新增死亡病例；新增疑似病例 2 例，均为境外输入病例（均在上海）。

当日新增治愈出院病例 9 例，解除医学观察的密切接触者 370 人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例 163 例（无重症病例），现有疑似病例 4 例。累计确诊病例 5195 例，累计治愈出院病例 5032 例，无死亡病例。



在北京市东城区崇外街道临时接种点，来自北京市普仁医院的医护人员在扫描新冠疫苗电子监管码，准备疫苗接种工作（资料图）。

A 将大规模为 60 岁以上人群接种新冠疫苗

3 月 21 日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍新冠疫苗安全性、有效性等有关情况。

国家卫健委新闻发言人米锋在新闻发布会上表示，截至 3 月 20 日 24 时，全国累计报告新冠疫苗

接种 7495.6 万剂次。

米锋表示，目前我国部分地区正在充分评估健康状况和被感染风险的前提下和一些因为特殊原因需要接种，并且身体基础状况较好的 60 岁以上的老年人接

种了新冠疫苗，相关的工作正在有序推进。同时，疫苗研发单位也在加快研发，在临床试验获得足够的安全性、有效性的数据后，将及时开展 60 岁以上老年人的大规模接种。

B 个人能否自主选择不同品牌的疫苗？

国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华对此表示，目前国内上市的疫苗都是经过政府主管部门审查批准的，是安全、有效的。由于各省市采购的上市

疫苗品种可能不同，所以每个人需按照所在省市的统一安排尽快接种疫苗。

此外，记者问到，如果之前接种过一个品牌的新冠疫苗，明年还需要继续接种的话，是只能选择同

一品牌还是可以叠加？

贺青华回应称，关于不同企业生产的疫苗是否可以叠加或替代接种的问题，还需要开展更多的研究，等研究结果出来以后，将根据研究结果提出明确的政策措施。

C 中国疾控中心副主任冯子健说，由于当前全球新冠疫情仍在持续流行，国内疫苗接种率较低，来自高流行地区的人员或物品入境，仍有导致在境内传播的风险。因

此，我国在人群疫苗接种达到较高免疫水平之前，无论是否接种疫苗，在人群聚集的室内或封闭场所，仍然需要继续佩戴口罩，并遵循各地的具体的防控措施要求。

其他的路线的疫苗随着研发的进展，也会陆续上市，而且这些疫苗的产能建设工作也已基本准备就绪，一旦产品获批，就会启动生产、上市供应，也会给大家提供更多的选择。

D 工业和信息化部消费品工业司副司长毛俊锋表示，目前，我们有 5 款疫苗，3 款灭活疫苗，1 款腺病毒载体疫苗，还有 1 款重组蛋白疫苗获批了附条件上市或者是获准了紧急使用。这些企业目前都在争分夺秒，24 小时满负荷组织生产，

毛俊锋指出，随着增产扩能工

作的前进，疫苗产量也在逐步放大。目前疫苗产量和 2 月初相比，短短一个多月的时间，已经有了大幅度的提高，下一步还会进一步提升。按照现有的生产安排来看，全年的疫苗产量完全可以满足全国人民的接种需求。

E 中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆表示，不良反应是大家非常关注的一个问题。关于疫苗，它对人体来说是一个外来的抗原，由于疫苗的特性，还有个体的差异，接种疫苗

之后都会出现一些不良反应，疫苗总的发生率还是相对较低的情况。

现在监测的不良反映主要包括局部的反应和全身的反应，局部的反应，接种之后会出现疼痛的情况，

有的会出现红肿，有的会出现硬结，这些局部的反应都不需要处理，自行会痊愈。全身反应表现相对多的，一个是头痛、乏力，有的还会出现低热的情况，这是目前监测的结果。

F 近日，陕西西安一新冠肺炎定点医院封闭隔离病区发现 1 例确诊病例。对此，王华庆表示，我们也在进一步了解和核实相关信息，包括预防接种史、新冠病毒感染后的发生发展过程以及其他相关信息。

王华庆称，关于肿瘤患者和孕妇，根据前期研究的结果显示，他们如果感染了新冠，其患重症的比例、病死率和其他人群相比是比较高的，所以应该接种疫苗。但是目前关于肿瘤患者、孕妇使用疫苗的系统研究数据还比较少。一般情况

下，如果作为一个新疫苗或减毒活疫苗，从慎重角度考虑是不给孕妇接种的。后期会随着数据的不断完善，策略也会做调整。

目前上市的新新冠疫苗在说明书中对于接种的禁忌有明确界定，主要包括几个方面：对疫苗所含

成分过敏者，既往发生过严重过敏反应如急性过敏反应、血管神经性水肿，呼吸困难等反应者，患有未控制的癫痫或者其他神经系统疾病的患者，有格林巴利综合症病史者；还有，在妊娠期间，或者哺乳期间的妇女等。

相关链接

我国科学家在《柳叶刀》刊发重要研究成果

新冠病毒抗体产生后至少可持续 9 个月

我国科学家在湖北武汉开展的一项血清流行病学追踪调查显示，当地人群新冠抗体阳性者中，40%存在可有效对抗病毒的抗体并至少可持续 9 个月。研究结果 19 日在国际知名医学期刊《柳叶刀》刊发。

该研究揭示了新冠病毒感染者血清抗体动态变化规律，对疫苗保护时效评估也具有借鉴价值。研究还显示，经校正后的人群抗体阳性率为 6.9%，说明即便疫情暴发，武汉也仅有小比例人群受染。

论文领衔作者、中国医学科学院北京协和医学院院校长王辰表示，评估感染新冠病毒并具有免疫力人群的比例，对于制定有效的疾病预防控制策略，降低未来再发大流行的可能性至关重要。

此项研究是在武汉开展的第一项长期血清流行病学追踪调查，也是截至目前全球观察时间最长、随访次数最多的前瞻性长期血清流行病学追踪调查，由中国医学科学院北京协和医学院、武汉市疾病预防控制中心、中国疾病预防控制中心等单位人员共同完成。

2020 年 4 月武汉“重启”后，研究人员在武汉所辖全部 13 个区，以严格的多阶段整群随机抽样方法对 3556 个家庭计 9542 名居民的代表性样本进行新冠病毒抗体检测，随后在 6 月以及 10 至 12 月进行随访。

此前，全球多国研究表明，据血清抗体阳性率推算的感染人数，远高于新冠肺炎诊断病例数，二者比值多在 10 倍以上。究其原因，主要是感染者中大部分为无症状感染者和轻症患者，可能未经检测或未就医。

论文共同作者、中国医学科学院北京协和医学院病原生物学研究所研究员任丽介绍，与确诊患者及有症状感染者相比，无症状感染者抗体水平较低，这一现象对未来精准防控工作具有指导价值。

“在检测、溯源和治疗资源远远不及的情况下，中国公共卫生系统成功控制了武汉暴发的新冠肺炎疫情。”国际知名微生物和免疫学专家理查德·斯特拉格内尔在同期《柳叶刀》上撰写述评指出，该研究使人们对大流行城市人群自然血清阳转情况有了更深入了解，是描述新冠病毒感染和理解大流行下免疫状态的重要里程碑。

综合新华社、中新网消息